Fragebogen zur Ermittlung des IPSS

Alle Angaben beziehen sich auf die letzten vier Wochen		niemals	seltener als in einem von fünf Fällen	seltener als in der Hälfte der Fälle	ungefähr in der Hälfte der Fälle	in mehr als der Hälfte der Fälle	fast immer
1.	Wie oft hatten Sie das Gefühl, dass Ihre Blase nach dem Wasserlassen nicht ganz entleert war?	o	1	2	3	4	5
2.	Wie oft mussten Sie innerhalb von zwei Stunden ein zweites Mal Wasser lassen?	0	1	2	3	4	5
3.	Wie oft mussten Sie beim Wasserlassen mehrmals aufhören und wieder neu beginnen (Harnstottern)?	o	1	2	3	4	5
4.	Wie oft hatten Sie Schwierig- keiten, das Wasserlassen hinauszuzögern?	0	1	2	3	4	5
5.	Wie oft hatten Sie einen schwachen Strahl beim Wasserlassen?	0	1	2	3	4	5
6.	Wie oft mussten Sie pressen oder sich anstrengen, um mit dem Wasserlassen zu beginnen?	0	1	2	3	4	5
7.	Wie oft sind Sie im Durchschnitt nachts aufgestanden, um Wasser zu lassen? (Maßgebend ist der Zeitraum vom Zubettgehen bis zum Aufstehen am Morgen.)	0	1	2	3	4	5

Gesamtsymptomen-Score IPSS =

Lebensqualitätsindex (L)

Wie würden Sie sich fühlen, wenn sich ihre jetzigen Symptome beim Wasserlassen nicht mehr ändern	ausge- zeichnet	zufrieden	überwiegend zufrieden	gemischt, teils zu- frieden, teils unzufrieden	überwiegend unzufrieden	unglücklich	sehr schlecht
würden?	0	1	2	3	4	5	6



URO-NEWS 2·2005 43